

Hepatitis A

Hepatitis A infection is caused by a virus (germ) that can easily spread from person-to-person. It can cause liver disease that can be severe and last several months. In some cases, people can die because of hepatitis A. People who are homeless are at greater risk of contracting (getting) this disease.

How does Hepatitis A spread?

- Touching objects or eating food that someone with hepatitis A infection handled
- Having sex with someone who has a hepatitis A infection
- Sharing needles, pipes or other items to take drugs

How can you prevent Hepatitis A?

- Get two shots of Hepatitis A vaccine
- Don't have sex with someone who has hepatitis A infection
- Use your own towels, toothbrush & utensils
- Don't share food, drinks, or smokes with other people
- Wash hands with soap and water after using the bathroom, and before preparing, serving or eating food

What are the symptoms of Hepatitis A?



Fever



Fatigue



Nausea



Loss of appetite



Jaundice
(yellowing of
skin or eyes)



Stomach
pain



Vomiting



Dark urine, pale
stools, and
diarrhea

Call 2-1-1 for more information or
to find medical and social services



Adapted from the County of San Diego Health and Human Services Agency

8/8/17

Hepatitis A

Hepatitis A infection is caused by a virus (germ) that can easily spread from person-to-person. It can cause liver disease that can be severe and last several months. In some cases, people can die because of hepatitis A. People who are homeless are at greater risk of contracting (getting) this disease.

How does Hepatitis A spread?

- Touching objects or eating food that someone with hepatitis A infection handled
- Having sex with someone who has a hepatitis A infection
- Sharing needles, pipes or other items to take drugs

How can you prevent Hepatitis A?

- Get two shots of Hepatitis A vaccine
- Don't have sex with someone who has hepatitis A infection
- Use your own towels, toothbrush & utensils
- Don't share food, drinks, or smokes with other people
- Wash hands with soap and water after using the bathroom, and before preparing, serving or eating food

What are the symptoms of Hepatitis A?



Fever



Fatigue



Nausea



Loss of appetite



Jaundice
(yellowing of
skin or eyes)



Stomach
pain



Vomiting



Dark urine, pale
stools, and
diarrhea

Call 2-1-1 for more information or
to find medical and social services



Adapted from the County of San Diego Health and Human Services Agency

8/8/17

Hepatitis A

Hepatitis A infection is caused by a virus (germ) that can easily spread from person-to-person. It can cause liver disease that can be severe and last several months. In some cases, people can die because of hepatitis A. People who are homeless are at greater risk of contracting (getting) this disease.

How does Hepatitis A spread?

- Touching objects or eating food that someone with hepatitis A infection handled
- Having sex with someone who has a hepatitis A infection
- Sharing needles, pipes or other items to take drugs

How can you prevent Hepatitis A?

- Get two shots of Hepatitis A vaccine
- Don't have sex with someone who has hepatitis A infection
- Use your own towels, toothbrush & utensils
- Don't share food, drinks, or smokes with other people
- Wash hands with soap and water after using the bathroom, and before preparing, serving or eating food

What are the symptoms of Hepatitis A?



Fever



Fatigue



Nausea



Loss of appetite



Jaundice
(yellowing of
skin or eyes)



Stomach
pain



Vomiting



Dark urine, pale
stools, and
diarrhea

Call 2-1-1 for more information or
to find medical and social services



Adapted from the County of San Diego Health and Human Services Agency

8/8/17

Hepatitis A

La infección de hepatitis A es causada por un virus (germen) que puede propagarse fácilmente de persona a persona. Puede causar enfermedad hepática (del hígado) que puede ser grave y durar varios meses. En algunos casos, las personas pueden morir debido a la hepatitis A. Las personas sin hogar corren mayor riesgo de contraer esta enfermedad.

¿Cómo se transmite la hepatitis A?

- Tocando objetos o comiendo alimentos que alguien con hepatitis A tocó
- Teniendo relaciones sexuales con alguien que tiene hepatitis A
- Compartiendo agujas, pipas u otros artículos para usar drogas

¿Cómo puede prevenir la hepatitis A?

- Recibir dos dosis de la vacuna contra hepatitis A
- No tener relaciones sexuales con alguien que este infectado con hepatitis A
- No compartir toallas, cepillos de dientes, ni cubiertos
- No compartir comida, bebidas o cigarrillos con otras personas
- Lavarse las manos con agua y jabón después de usar el baño y antes de preparar, servir o comer alimentos

¿Cuáles son los síntomas de la hepatitis A?



Fiebre



Cansancio



Náusea



Pérdida de Apetito



Ictericia
(Coloración amarillenta de piel u ojos)



Dolor Estomacal



Vómito



Orina oscura, heces blancas, y diarrea

Llame al 2-1-1 para obtener más información o para encontrar servicios médicos y sociales.  **CONDADO DE LOS ANGELES**
Salud Pública

Adaptado de la Agencia de Salud y Servicios Humanos del Condado de San Diego 8/8/17

Hepatitis A

La infección de hepatitis A es causada por un virus (germen) que puede propagarse fácilmente de persona a persona. Puede causar enfermedad hepática (del hígado) que puede ser grave y durar varios meses. En algunos casos, las personas pueden morir debido a la hepatitis A. Las personas sin hogar corren mayor riesgo de contraer esta enfermedad.

¿Cómo se transmite la hepatitis A?

- Tocando objetos o comiendo alimentos que alguien con hepatitis A tocó
- Teniendo relaciones sexuales con alguien que tiene hepatitis A
- Compartiendo agujas, pipas u otros artículos para usar drogas

¿Cómo puede prevenir la hepatitis A?

- Recibir dos dosis de la vacuna contra hepatitis A
- No tener relaciones sexuales con alguien que este infectado con hepatitis A
- No compartir toallas, cepillos de dientes, ni cubiertos
- No compartir comida, bebidas o cigarrillos con otras personas
- Lavarse las manos con agua y jabón después de usar el baño y antes de preparar, servir o comer alimentos

¿Cuáles son los síntomas de la hepatitis A?



Fiebre



Cansancio



Náusea



Pérdida de Apetito



Ictericia
(Coloración amarillenta de piel u ojos)



Dolor Estomacal



Vómito



Orina oscura, heces blancas, y diarrea

Llame al 2-1-1 para obtener más información o para encontrar servicios médicos y sociales.  **CONDADO DE LOS ANGELES**
Salud Pública

Adaptado de la Agencia de Salud y Servicios Humanos del Condado de San Diego 8/8/17

Hepatitis A

La infección de hepatitis A es causada por un virus (germen) que puede propagarse fácilmente de persona a persona. Puede causar enfermedad hepática (del hígado) que puede ser grave y durar varios meses. En algunos casos, las personas pueden morir debido a la hepatitis A. Las personas sin hogar corren mayor riesgo de contraer esta enfermedad.

¿Cómo se transmite la hepatitis A?

- Tocando objetos o comiendo alimentos que alguien con hepatitis A tocó
- Teniendo relaciones sexuales con alguien que tiene hepatitis A
- Compartiendo agujas, pipas u otros artículos para usar drogas

¿Cómo puede prevenir la hepatitis A?

- Recibir dos dosis de la vacuna contra hepatitis A
- No tener relaciones sexuales con alguien que este infectado con hepatitis A
- No compartir toallas, cepillos de dientes, ni cubiertos
- No compartir comida, bebidas o cigarrillos con otras personas
- Lavarse las manos con agua y jabón después de usar el baño y antes de preparar, servir o comer alimentos

¿Cuáles son los síntomas de la hepatitis A?



Fiebre



Cansancio



Náusea



Pérdida de Apetito



Ictericia
(Coloración amarillenta de piel u ojos)



Dolor Estomacal



Vómito



Orina oscura, heces blancas, y diarrea

Llame al 2-1-1 para obtener más información o para encontrar servicios médicos y sociales.  **CONDADO DE LOS ANGELES**
Salud Pública

Adaptado de la Agencia de Salud y Servicios Humanos del Condado de San Diego 8/8/17